

10 Mai 1988

N° de série continue 172

Bulletin n° 12

**POMMIER GOLDEN : PENDANT UN MOIS ENCORE, ATTENTION AU RUSSETING
VIGNE : MILDIOU - 1er TRAITEMENT EN TOUTE SITUATION**

PECHER : Myzus - Surveillez et intervenez si nécessaire
POIRIER-POMMIER : Carpocapse - Des dates pour le 1er traitement
P. 3 : tableau des produits utilisables
VIGNE : Mildiou - Début de protection en toute situation
P. 4 : tableau des produits anti-mildiou

ARBRES FRUITIERS

PECHER

TAVELURE - Poursuivez la protection en fonction des conditions climatiques

OIDIUM - Surveillez l'apparition de taches sur fruits des variétés peu sensibles

Les vergers atteints seront alors protégés dès que possible.

En verger sensible, poursuivez la protection.

TORDEUSE ORIENTALE - Protection des pousses : traitement dès réception...

... s'il n'est déjà fait. Sont concernés les pépinières, jeunes arbres 1ère pousse et les vergers ayant subi de fortes attaques sur fruits en 1987.

PUCERON VERT (MYZUS) - Surveillez les redémarrages

Localement, quelques foyers se développent dans lesquels souvent des prédateurs (syrphes) se sont installés.

Pas d'intervention systématique : observez et traitez si nécessaire.

Dans ce cas, il faut intervenir sans tarder, pour ne pas avoir à traiter à l'approche de la période de migration des Myzus.

On évitera l'emploi des pyréthrinoides les plus toxiques sur les prédateurs.

PRUNIER

ROUILLE - 1er traitement avant la fin de la semaine (rappel).

POIRIER

PSYLLES - Il est encore trop tôt pour intervenir sur la 2ème génération

POMMIER

OIDIUM - Maintenez une protection soignée

Dans certains vergers mal protégés, les attaques sur pousses progressent.

RUGOSITE - Des risques importants pendant un mois encore

A la liste des produits désensibilisants, il convient d'ajouter REGULEX.

Dans tous les cas, suivez scrupuleusement les directives du fabricant.

P.13.14

POIRIER - POMMIER

TAVELURES - Soignez la protection

En basant la lutte à chaque fois que c'est possible sur l'utilisation de produits de contact.

PUCERONS : MAUVE du POIRIER, CENDRE du POMMIER - Surveillez les redémarrages de ces dangereux pucerons,

pour intervenir immédiatement en cas de présence.

CARPOCAPSE - Des dates pour le 1er traitement régions précoces et moyennes

Un vol soutenu en région précoce.

Voici les dates prévues pour le 1er traitement selon le type de produit :

Région Produit	Précoce ST JUST, CHAMBONAS	Moyenne ST SERNIN, ROSIERES GROSPIERRES...	Tardive MEYRAS, HAUTS DE VESSEAUX...
DIMILIN, DART, NOMOLT ou INSEGAR (fenoxycarbe 10 g ma/hl)	dès réception s'il n'est déjà fait	vers les 14-17 Mai	Attendez encore
Larvicide	vers les 16-18 Mai	Attendez encore	Attendez encore

Larvicides : choisissez un produit peu dangereux pour les auxiliaires, type phosalone.

PETITS FRUITS

CASSIS

OIDIUM - Après la floraison, 3 traitements à 15 jours d'intervalle

Ajoutez un produit compatible efficace sur anthracnose.

FRAMBOISIER

POURRITURE GRISE - 1er traitement à la pleine floraison

Intervention le soir en dehors des heures de butinage de préférence.

Produit : EUPARENE ou ROVRAL. Ajoutez phosalone contre les vers des framboises.

VIGNE

BLACK-ROT - Les préconisations de nos précédents Bulletins restent valables

MILDIOU - Commencez la protection dès réception

Une situation préoccupante : les 1ers foyers ont été découverts

Suite aux pluies des 19-20 Avril, plusieurs foyers primaires ont été découverts en fin de semaine dernière à ST JUST D'ARDECHE, BARJAC, ST SAUVEUR, ST ANDRE DE CRUZIERES et ORGNAC. Il s'agit de quelques taches isolées, souvent sur des sagattes, traînant par terre. Il est exceptionnel de trouver des foyers de mildiou si tôt en saison.

D'autres séries de foyers pourraient apparaître en ce moment suite aux pluies des 23, 24 et 25 Avril, et vers la mi-Mai suite aux pluies des 2-3 Mai.

De nouvelles contaminations et les premiers repiquages ont pu se produire lors de la pluie du 8 Mai. Les températures étaient assez favorables au mildiou. Les taches pourraient apparaître dans la semaine du 16 au 20 Mai, en formant des foyers sans doute plus nombreux.

Préconisations - Débutez la protection par un traitement dès réception

P. 4 : tableau des produits utilisables.

On préférera un produit à base de cymoxanil ou de phoséthyl Al, particulièrement sur les foyers.

Réservez l'usage des anilides (ACYLON, CALTAN, VAMIN, TAIREL, GALBEN, PULSAN, SIRDAT) pour la période de floraison, pour limiter les risques d'apparition de souches de mildiou résistantes à cette famille de produits.

La protection sera ensuite renouvelée selon la rémanence du produit choisi et les conditions climatiques.

LE CONCOURS MILDIOU RESTE OUVERT :
POURSUIVEZ LA RECHERCHE DES FOYERS PRIMAIRES